

Instrucciones postoperatorias

Endodoncias

En primer lugar, felicidades, ¡lograste la endodoncia! Esperemos que, considerando las circunstancias, hayas tenido una experiencia agradable. Ese es realmente nuestro objetivo. Esta hoja repasará información sobre qué esperar durante las próximas semanas ahora que se completó el tratamiento de conducto. Siga las instrucciones que se describen a continuación y contáctenos si surge alguna pregunta.

1. NO coma ni beba nada durante la siguiente media hora. NO intente palpar alrededor del diente con la lengua. Tiene un empaste temporal en el diente y tarda aproximadamente media hora en endurecerse.
2. Debe tener un empaste permanente o una corona en el diente dentro de 1 mes de completarse el tratamiento de conducto. Es esencial que usted haga un seguimiento con nuestra oficina sobre esto. Si no se hace, es muy probable que el diente se fracture o desarrolle nuevas caries debajo del empaste temporal, lo que puede causar que el tratamiento de conducto falle. Usted será responsable de todos los costos incurridos si no sigue estas instrucciones.
3. NO use el diente para morder nada duro (maní, pretzels, hielo, etc.) hasta que se haya colocado el empaste/corona permanente en el diente. Nuevamente, el diente es propenso a fracturarse y si muerdes algo demasiado duro o crujiente puedes romper el diente.
4. Es normal que el relleno temporal se “divida” con el uso. Es muy raro que se caiga por completo. Si el temporal se cae, debe contactarnos lo antes posible. Si ocurre cuando la oficina está cerrada, te recomendamos venir o llamarnos al día siguiente.
5. Es normal que haya alguna pequeña molestia en la zona después de la endodoncia. Es normal que el diente sienta molestias durante 2 o 3 días después del tratamiento de hoy. A veces, dependiendo de las circunstancias, el diente y los tejidos circundantes pueden permanecer doloridos durante algunas semanas después del tratamiento. Las tres razones más comunes del dolor son:
 - o Dolor en la articulación de la mandíbula por tener la boca abierta durante un tiempo prolongado
 - o Dolor muscular en el lugar de la inyección
 - o Dolor de encías por la colocación del dique de goma.
6. Para el dolor, le recomendamos tomar 600 mg de ibuprofeno (3 pastillas de Advil o Motrin o equivalente genérico) cada 6 horas. El 90% de las veces esto es suficiente para manejar el malestar. Si no es así, comuníquese con nuestra oficina y nos aseguraremos de que se sienta cómodo.



126 Deodar Ave., Oxnard, CA 93030
805.983.0717



70 E. Daily Dr., Camarillo, CA 93010
805.987.1711

7. Si le recetan algún medicamento relacionado con este tratamiento, tómelo según las instrucciones de su médico.
8. Puede usar hilo dental y cepillarse los dientes normalmente, a menos que el médico le indique lo contrario.

POR FAVOR LEA LA ÚLTIMA SECCIÓN ES MUY IMPORTANTE!!!

Brotos

Aunque alrededor del 95% de los tratamientos de conducto causan muy poca o ninguna molestia después de completar el tratamiento, hay alrededor del 5% de los casos que pueden causar un dolor significativo. Estos se conocen comúnmente como “brotos”. Ocurren principalmente en dientes muy infectados, dientes extremadamente irritados o dientes que tener antecedentes de tratamiento previo. A veces, sin embargo, ocurren de forma aleatoria, incluso en pacientes a los que se les han realizado varias endodoncias previamente sin ningún problema.

Si tiene un brote, puede experimentar dolor de moderado a intenso, hinchazón (puede llegar a ser tan grande como una pelota de golf), hematomas, pulsaciones y malestar general, que generalmente comienza unas horas después del tratamiento y puede durar de 2 a 3 días. .

No dude en llamarnos si tiene alguna inquietud sobre las complicaciones de su tratamiento.



126 Deodar Ave., Oxnard, CA 93030
805.983.0717



70 E. Daily Dr., Camarillo, CA 93010
805.987.1711